

Anti-GAPDH antibody

试剂组成

A20120A0701	规格	数量
Anti-GAPDH antibody	100μL/支	1 支
说明书		1 份

产品介绍

Anti-GAPDH antibody 作为 Western Blotting 的内参抗体, 主要用于参考 Western 上样量是否一致。

运输与储存

本产品采用冰袋或干冰运输 (根据目的地和同运产品而定)。产品在收到后应立即贮存于-20℃。

如果贮存于-20℃, 有效期为运达后一年。

产品使用限制

本产品只用于分子生物学研究。其不应用于诊断、预防和治疗疾病。在使用本产品时应遵从相应的注意事项。

操作说明 (以下实验操作可根据各实验室经验做适当调整)

1. Western 转膜结束后, 剪取蛋白分子量为 36 KDa 左右的转印膜, 进行封闭;
2. 封闭完成后, 将本产品按比例 (1:1000) 加入到洗涤缓冲液 (TBS-T 或 PBS-T) 中, 缓慢摇匀。将印迹膜完全浸泡于混合液, 室温孵育 2 小时或 4℃过夜。摇床孵育效果更好;
3. 更换洗涤缓冲液 (TBS-T 或 PBS-T), 洗涤印迹膜 3 次, 每次 5-10 分钟;
4. 进行后续 Western 操作。

注意事项

1. 本产品可检测蛋白分子量为 36 KDa 左右;
2. 本产品含有甘油, 使用前请振荡摇匀, 以免影响实验效果;
3. 本产品推荐稀释比例为 1:1000, 可根据实验情况做适当调节;
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴防护手套操作。

技术支持

BioTNT 为其所提供的技术支持质量和效率而自豪。我们的技术支持部门在样品及检测领域及对 BioTNT 产品具有丰富的实践经验和充足的理论知识。如果您对 Western 或其它产品有问题或遇到困难, 请联系我们, 无需迟疑。

BioTNT 客户是我们产品改进和特殊应用信息的主要来源。您所提供的信息对于 BioTNT 的研究人员很有帮助。当您对产品性能或新的应用及新的技术有任何建议时, 我们希望您能及时联系我们。

有关技术支持和更多信息, 请浏览 www.biotnt.com 的网页或致电 BioTNT 的技术支持部门。